



RECOMENDACIONES PREOPERATORIAS EN CIRUGIA ORAL Y/O IMPLANTOLOGIA

- La intervención que se realizará en clínica es un procedimiento quirúrgico menor, que se hace bajo anestesia local y que no precisa de un estudio preoperatorio completo.
- Deberá acudir acompañado y seguir algunas instrucciones que pueden serle útiles.
- No es necesario acudir en ayunas, aunque sí es conveniente no haber ingerido grandes cantidades de alimentos unas horas antes.
- Tomar la medicación habitual excepto que el facultativo le recomiende lo contrario.
- Si padece alguna lesión cardiaca no olvide avisarlo antes, dado que precisa unas recomendaciones específicas.
- Deberá traer las pruebas previas realizadas (radiografías, análisis, etc.)
- Enjuagarse con algún líquido antiséptico (Perio-aid tratamiento) 3 veces al día 24 horas antes.
- Augmentine 500 mgr. 1 comprimido cada 8 horas 24 horas antes (en pacientes alérgicos a la penicilina tomar Rhodogil 750 000 U.I./125 mgr 2c/8 horas 24 horas antes).
- Espidifen® 600 mgr 1 sobre 1 hora antes de la cirugía (no indicado en alérgicos a AINES o asmáticos).
- Valium® 5 mgr 1 comprimido 1 hora antes de la cirugía (sólo en caso de prescripción facultativa).