

# **INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES**



**CLÍNICA BARA-GASENI**  
DENTAL & MAXIL·LOFACIAL

[www.medico-especialista.com/baragaseni](http://www.medico-especialista.com/baragaseni)

[baragaseni@infomed](mailto:baragaseni@infomed)

Tel. 93 345 20 41 / 93 345 38 72



## Primeros días...

En los primeros días de uso de su prótesis sobre implantes...

- ✓ La pronunciación de algunos sonidos puede resultar difícil.
- ✓ Puede tener la impresión de que los dientes son demasiado grandes, o que le falta espacio para la lengua. Esta sensación desaparecerá paulatinamente.
- ✓ Es probable que se muerda las mejillas y la lengua. No se preocupe. Aprenderá a evitarlo. Mastique con cuidado. Trate las heridas con algún gel para aliviar el dolor ( por ejemplo: **Aloclair Plus gel®**).

## Cuidados e higiene

Acudir al dentista sí:

- ✓ Se mueve o suelta la prótesis cementada (generalmente se emplean cementos provisionales).
- ✓ Si se nota movilidad en el caso de prótesis atornilladas (podrían romperse los tornillos).
- ✓ Si aparece dolor, inflamación o sangrado de las encías.
- ✓ Las prótesis de resina e incluso las de cerámica pueden romperse si reciben fuerzas excesivas. NO parta con los dientes anteriores alimentos duros, como frutos secos o mariscos, bocadillos o manzanas.





Si tiene el mal hábito de apretar los maxilares en exceso (bruxismo), es conveniente utilizar un protector bucal (férula) nocturno.

**La higiene de la boca** debe hacerse inmediatamente después de cada comida y especialmente en profundidad antes de acostarse:

- Con cepillo dental y pasta dentrífica.
- Con cepillos interdentes o con **Superfloss® (Oral B)** en caso de espacios muy reducidos.
- Es conveniente el uso de irrigadores bucales tipo (**Water-Pick®** o **So-Wash®**)

Con el tiempo puede haber una cierta retracción de las encías que puede dejar a la vista la unión del implante y la prótesis. Consultar con su dentista si este proceso aparece.

## Revisiones periódicas

Recuerde que los implantes dentales son prótesis implantadas en el hueso que no reciben ningún tipo de sensibilidad, por lo que en muchas ocasiones, no avisarán con dolor en caso que aparezca alguna complicación. Por ello, es muy importante acudir a las visitas de revisión cada 6 meses o 1 año, con el fin de corregir a tiempo la aparición de cualquier anomalía.



**Y por último no olvide que:**



+



=

**RIESGO DE  
COMPLICACIONES**



 *Catalana Dental, s.a.*

 **HI-TEC IMPLANTS**  
Advanced new technology  
Tite-Fit™ Implant 

*white*  
**SKY**  
IMPLANT SYSTEM



**NATURALMENTE BONITO!**

breident  
medical

